

Fruti-K®

Fertilizante Inorgánico.
Polvo Soluble



Fruti-K®

Fertilizante Inorgánico.
Polvo Soluble

Descripción:

FRUTI-K® es un producto diseñado y orientado para mejorar el crecimiento, desarrollo y amarre de frutos en frutales proporcionando mayor calibre, dureza, consistencia y capacidad para la conservación y transporte. Su formulación permite complementar la nutrición en los cultivos mencionados dada su alta y balanceada concentración de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Zinc y Boro, elementos demandados en etapas de crecimiento, desarrollo y amarre de frutos.

Beneficios:

- * Mayor estímulo nutritivo y fisiológico.
- * Mayor superficie foliar y asimilación de fotosintatos.
- * Desarrollo de hojas y tallos en mayor cantidad.
- * Mayor asimilación de nutrientes.
- * Formación de tejido vascular (xilema).
- * Mejor desarrollo y amarre de frutos y semillas.
- * Estructura vegetal más tolerante en condiciones de estrés.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% EN VOLUMEN
Nitrógeno Total (N)	10.00
Fósforo aprovechable (P ₂ O ₅)	5.0
Potasio soluble (K ₂ O)	30.00
Azufre (S)	2.40
Boro (B)	1.00
Zinc (Zn)	5.00
Agentes quelantes	1.00
Ácidos fúlvicos	0.5
Antiapelmazantes e inertes	45.10
TOTAL	100.00

Características físicas y químicas:

Apariencia	Polvo arenoso, color beige, olor característico.
Solubilidad	Completamente soluble en agua
Tiempo de Humectación	Menor a 60 segundos.
pH en solución al 1%	5.0 +/- 0.2

Recomendaciones de Uso:

Se recomienda por aspersión (aérea o terrestre), disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento de todos los órganos aéreos de la planta. Se recomienda acondicionar el agua de aplicación con **ACIDEX-F®** a un pH de 5 a 6 para mejorar las absorción del producto.

CULTIVO	DOSIS L/Ha	ETAPAS DE APLICACIÓN
Café (Coffea arabica L.)	3 a 4 Kg / Ha	Aplicar a los 15 días después del amarre de frutos y repetir a los 21 y 30 días
Banano (Musa paradisiaca)	3 a 4 Kg / Ha	Aplicar cada 10 días
Papayo (Carica papaya)	3 a 4 Kg / Ha	Aplicar a los 40 días después de iniciada la floración y repetir cada 20 días hasta antes de cosecha
Mango (Mangifera indica) Aguate (Persea Americana)	3 a 4 Kg / Ha	Aplicar a los 40 días después de iniciada la floración y repetir cada 20 días hasta antes de cosecha
Frutales Caducifolios	3 a 4 Kg / Ha	Aplicar cuando el fruto haya alcanzado más de 1.5 pulgadas de diámetro y repetir cada 30 días

